

水溶性氧化矽: 24.0%
水溶性氧化鉀: 16.5%

友達晶材
AUO Crystal

矽美壯

• 肥料品目(編號): 混合鉀質肥料(3-10)
• 肥料登記證字號: 肥製(質)字第0000000號

使用方法

備定時，于幼植園或植物生長初期，以樹冠範圍之多寡，酌量施於株尾端；或於移植後再施於栽植行間中心，移植初期此時，施注於土壤中。

使用量

● 雙面葉類: 800倍以上 ● 土壤澆注: 300倍以上

製造廠及來源	其他成分
110年 友達晶材晶材股份有限公司 110年 友達晶材晶材股份有限公司 110年	水分: 1%以下、重金屬: 10ppm以下、 殘留性磷: 20ppm、 性狀: 結晶、 包裝規格: 1.5kg、1000g、500g (於美國市場銷售)

注意事項

1. 請於30°C以下之溫度環境中，避光保存。請於20°C以上、25°C以下之溫度環境中，於陰涼及通風處貯存。請於陰涼處貯存。

• 宜在農作園施用。• 施於農作園時，宜於10cm以上之深度。


肥料成分表: 水溶性矽酸鉀(質)肥料
品目: 3-10(3-10) 混合鉀質肥料(3-10) 類
製造日期: 110年01月01日
批發日期: 110年01月01日
零售日期: 110年01月01日
110年01月01日
110年01月01日

矽美壯施用方法

為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

水稻



**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 葉噴需搭配展著劑使用。
3. 孕穗期使用矽美壯時可搭配高磷鉀肥一起使用效果更佳。
4. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。




未施用矽美壯



施用矽美壯
AUO Crystal

ACC肥料施用方法

玉米



**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 葉噴需搭配展著劑使用。
3. 吐花前施用時可搭配藻精，效果更佳。
4. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。




未施用矽美壯



施用矽美壯

ACC肥料施用方法

小麥




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 葉噴需搭配展著劑使用。
3. 最後一次施用時間為灌漿期，建議搭配高磷鉀肥一起施用，效果更佳。
4. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

矽美壯施用方法

蝴蝶蘭



**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 建議與其他花肥一起施用時，含鉀肥料不宜施灑過多，避免植株肥傷。
3. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。



未施用矽美壯 施用矽美壯

ACC肥料施用方法

高麗菜




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

花椰菜




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

茄科




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 因作物為連續採收，其他肥料仍須補足才有最好效益。
3. 果實連續生長期矽美壯、矽鈣勇+胺基酸需交替使用，才能達到補氮補鈣的效果。
4. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

西瓜




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 有使用矽美壯情況下，建議不要用海草精類的肥料(怕重鉀)。
3. 採收前兩周施用時建議搭配高磷鉀肥一起施用效果更佳。
4. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

空心菜(蕹菜)




****注意事項:**

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

桃




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 採收前兩周施用時建議搭配藻精一起使用效果更佳。
3. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

柑橘




**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 採收前兩周建議搭配海草精一起使用效果更佳。
3. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

ACC肥料施用方法

柚子



**注意事項:

1. 與肥料或其他資材一同使用前可少量混合，若無沉澱即可。
2. 中果期之後就可以加海藻精一起使用效果更佳。
3. 各項產品為單質肥料，在植物生長時仍需其他生長要素配合使用才能達到最好效果。

AUO

Innovating Life